

## Kapitel 6

# Grenzwert und Stetigkeit

# Grenzwert einer Funktion

Was passiert mit dem Funktionswert einer Funktion  $f$ , wenn das Argument  $x$  gegen einen bestimmten Wert  $x_0$  strebt?  
(Wobei  $x_0$  nicht zum Definitionsbereich von  $f$  gehören muss.)


Die Funktion

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

ist in  $x = 1$  nicht definiert.

Durch Faktorisieren und Kürzen erhalten wir die Funktion

$$g(x) = x + 1 = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \neq 1 \\ 2, & \text{falls } x = 1 \end{cases}$$




# Grenzwert einer Funktion

Wenn wir uns in der Funktion  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$  dem Argument  $x_0 = 1$  nähern (egal wie), und uns ansehen, was mit dem Funktionswert geschieht, dann landen wir bei  $y = 2$ .

Wir sagen:  $f(x)$  **konvergiert** gegen 2, wenn  $x$  gegen 1 strebt

und schreiben:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$



# Grenzwert einer Funktion

Mathematisch wird das so formuliert:

Wenn für jede konvergente Folge von Argumenten  $(x_n) \rightarrow x_0$  die Folge der Funktionswerte  $(f(x_n))$  gegen eine Zahl  $a$  konvergiert, so heißt  $a$  der **Grenzwert** (oder **Limes**) der Funktion  $f$  *an der Stelle*  $x_0$ .

Wir schreiben dafür

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \quad \text{oder} \quad f(x) \rightarrow a \text{ für } x \rightarrow x_0$$

$x_0$  muss nicht in der Definitionsmenge liegen.

Genauso muß  $a$  nicht in der Wertemenge der Funktion liegen.

# Rechenregeln

Für Limiten von Funktionen gelten analoge Rechenregeln wie für Grenzwerte von Folgen.

Seien  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$  und  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$ .

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (c \cdot f(x) + d) = c \cdot a + d$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = a + b$$

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = a \cdot b$$

$$(4) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b} \quad \text{für } b \neq 0$$

$$(6) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^k = a^k \quad \text{für } k \in \mathbb{N}$$

# Bestimmen eines Grenzwertes

Für einfache Funktionen eignet sich folgende Vorgangsweise:

1. Wir zeichnen den Graphen der Funktion.
2. Wir zeichnen den Wert  $x_0$  auf der  $x$ -Achse ein.
3. Wir setzen den Bleistift auf dem Graphen und führen ihn auf dem Graphen von *rechts* bis zum  $x_0$ -Wert.
4. Wir lesen den  $y$ -Wert dieses Punktes von  $y$ -Achse ab. Dieser Wert heißt der **rechtsseitige Grenzwert** von  $f$  an der Stelle  $x_0$ :


$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

5. Analog erhalten wir von der *linken* Seite den **linksseitige Grenzwert** von  $f$  an der Stelle  $x_0$ :  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ .

6. Wenn beide Limiten *gleich* sind, so existiert der Grenzwert und es gilt

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

# Beispiel



$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{für } x < 0 \\ 1 - \frac{x^2}{2}, & \text{für } 0 \leq x < 1 \\ \frac{x}{2} + 1, & \text{für } x \geq 1 \end{cases}$$

$$0,5 = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1,5$$

d.h., der Grenzwert an der Stelle  $x_0 = 1$  existiert nicht.

Der Grenzwert an anderen Stellen existiert hingegen,


z.B.  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1.$

# Unbeschränkte Funktion

Es gibt gegen  $\infty$  (oder  $-\infty$ ) wenn  $x$  gegen  $x_0$  strebt.

Wir schreiben dann (in abuse of language):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$



$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$



# Grenzwert gegen $\infty$

Der Grenzwertbegriff gilt analog, wenn wir  $x_0 = \infty$  oder  $x_0 = -\infty$  setzen.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$$

existiert, falls  $f(x)$  gegen einen Wert  $y$  konvergiert, wenn  $x$  immer größer wird.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

# Aufgabe 6.1

Zeichnen Sie den Graphen der Funktion

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{x^2}{2} & \text{für } x \leq -2 \\ x + 1 & \text{für } -2 < x < 2 \\ \frac{x^2}{2} & \text{für } x \geq 2 \end{cases}$$

Berechnen Sie  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$  und  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$   
für  $x_0 = -2, 0$  und  $2$ :

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) =$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) =$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) =$$


$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) =$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) =$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) =$$

# Lösung 6.1



$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -2, \quad \lim_{x \rightarrow -2} f(x) \text{ existiert nicht;}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1;$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ existiert nicht;}$$

$f$  ist stetig in 0 und nicht stetig in  $-2$  und  $2$ .

## Aufgabe 6.2

Überlegen Sie sich den links- bzw. rechtsseitigen Grenzwert für

$$\text{(a)} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) =$$

$$\text{für } f(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } x \neq 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

$$\text{(b)} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} =$$

$$\text{(c)} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} x =$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x =$$

## Lösung 6.2

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0;$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty;$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 1^-} x = \lim_{x \rightarrow 1^+} x = 1.$$

## Aufgabe 6.3

Geben Sie folgende Grenzwerte an, sofern sie existieren.

(a)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+1}$

(b)  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2$

(c)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x)$

(d)  $\lim_{x \rightarrow 0} \ln |x|$

(e)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x-1}$

# Lösung 6.3

(a) 0;

(b) 0;

(c)  $\infty$ ;

(d)  $-\infty$ ;

(e) 1.

# Aufgabe 6.4

Bestimmen Sie

$$(a) \lim_{x \downarrow 1} \frac{x^{3/2} - 1}{x^3 - 1}$$

$$(b) \lim_{x \uparrow -2} \frac{\sqrt{|x^2 - 4|^2}}{x + 2}$$

$$(c) \lim_{x \uparrow 0} \lfloor x \rfloor$$

$$(d) \lim_{x \downarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x - 1}}$$

$$(e) \lim_{x \downarrow 2} \frac{2x^2 - 3x - 2}{|x - 2|}$$

$$(f) \lim_{x \uparrow 2} \frac{2x^2 - 3x - 2}{|x - 2|}$$

$$(g) \lim_{x \downarrow -2} \frac{|x + 2|^{3/2}}{2 + x}$$

$$(h) \lim_{x \uparrow 1} \frac{x + 1}{x^2 - 1}$$



## Aufgabe 6.4 / 2

$$(i) \lim_{x \downarrow -7} \frac{2|x+7|}{x^2+4x-21}$$

Hinweis:  $\lfloor x \rfloor$  ist die größte ganze Zahl kleiner oder gleich  $x$ .

# Lösung 6.4

(a)  $\frac{1}{2}$ ; (b)  $-4$ ; (c)  $-1$ ; (d)  $0$ ; (e)  $5$ ; (f)  $-5$ ; (g)  $0$ ; (h)  $-\infty$ ; (i)  $-\frac{1}{5}$ .

# Aufgabe 6.5

Berechnen Sie den Grenzwert von

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

für

**(a)**  $f(x) = x$

**(b)**  $f(x) = x^2$

**(c)**  $f(x) = x^3$

**(d)**  $f(x) = x^n$ , für  $n \in \mathbb{N}$ .

# Lösung 6.5

(a) 1;

(b)  $2x$ ;

(c)  $3x^2$ ;

(d)  $nx^{n-1}$ .

# Regel von de l'Hospital

Bei der Bestimmung des Grenzwertes

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

kann es vorkommen, dass

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 \quad (\text{oder} = \pm\infty)$$

Allerdings sind Ausdrücke wie  $\frac{0}{0}$  oder  $\frac{\infty}{\infty}$  nicht definiert.

(Man kann nicht einfach durch 0 oder  $\infty$  kürzen!)

# Regel von de l'Hospital

Wenn  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$  (oder  $= \infty$  oder  $= -\infty$ ), dann gilt

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Vorsetzung:  $f$  und  $g$  sind in  $x_0$  differenzierbar.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 7x + 6}{x^2 - x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 7}{2x - 1} = \frac{5}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2x^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1+x)^{-1}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{-2}}{2} = \frac{1}{2}$$

# Aufgabe 6.6

Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 2x - 8}{x^3 - 2x^2 - 11x + 12} =$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x - 8}{x^3 - 2x^2 - 11x + 12} =$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 5x^2 + 8x - 4}{x^3 - 3x^2 + 4} =$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} =$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) =$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln(x) =$$

# Lösung 6.6

(a)  $\frac{2}{7}$ ;

(b)  $-\frac{1}{4}$ ;

(c)  $\frac{1}{3}$ ;

(d)  $\frac{1}{2}$ ;

(e)  $= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-1}} = 0$ ;

(f)  $\infty$ .

In (b) und (f) kann die Regel von de l'Hospital nicht verwendet werden.



## Aufgabe 6.7

Warum führt die folgende Anwendung der Regel von de l'Hospital zu einem falschen Ergebnis? (Der wahre Grenzwert ist 2.)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x + 2}{2} = 4$$

## Lösung 6.7

Die Voraussetzung für die Anwendung der Regel von de l'Hospital ist für den zweiten Quotienten nicht gegeben. (Der Nenner strebt nicht gegen 0.)


# Stetigkeit

Beim Zeichnen von Graphen fällt auf, dass es Funktionen gibt, die sich *ohne Absetzen des Bleistifts* zeichnen lassen.


Solche Funktionen heißen **stetig**.

Andere Funktionen besitzen *Sprungstellen* und man muss beim Zeichnen den Bleistift vom Papier heben. Solche Stellen heißen *Unstetigkeitsstellen* der Funktion.

Der Graph der Funktion  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$  im Intervall  $[-2, 2]$ :



stetig



unstetig in  $x = 1$

# Stetigkeit

Formal läßt sich das so ausdrücken:

## Definition:

Eine Funktion  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  heißt **stetig** an der Stelle  $x_0 \in D$ , falls


1.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  existiert,
2.  $f(x_0)$  existiert, und
3.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ .

Die Funktion heißt *stetig*, falls sie in allen Punkten des Definitionsbereichs stetig ist.

# Stetigkeit

Vorgangsweise für einfache Funktionen:

- (1) Wir zeichnen den Graphen der Funktion.
- (2) In allen Punkten des *Definitionsbereichs*, in denen wir beim Zeichnen *nicht* den Bleistift absetzen müssen, ist die Funktion stetig.
- (3) In allen Punkten des *Definitionsbereichs*, in denen wir absetzen müssen ist, die Funktion nicht stetig.



$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{für } x < 0 \\ 1 - \frac{x^2}{2}, & \text{für } 0 \leq x < 1 \\ \frac{x}{2} + 1, & \text{für } x \geq 1 \end{cases}$$

$f$  ist überall stetig  
außer im Punkt  $x = 1$ .

# Aufgabe 6.8

Zeichnen Sie den Graphen der Funktion


$$f(x) = \begin{cases} -\frac{x^2}{2} & \text{für } x \leq -2 \\ x + 1 & \text{für } -2 < x < 2 \\ \frac{x^2}{2} & \text{für } x \geq 2 \end{cases}$$

Berechnen Sie  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$  und  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

für  $x_0 = -2, 0$  und  $2$ .

Ist  $f$  in diesen Punkten stetig?

# Lösung 6.8



$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -2, \quad \lim_{x \rightarrow -2} f(x) \text{ existiert nicht;}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1;$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ existiert nicht;}$$

$f$  ist stetig in 0 und nicht stetig in  $-2$  und  $2$ .

## Aufgabe 6.9

Bestimmen Sie den links- und rechtsseitigen Grenzwert der Funktion

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{für } x > 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \\ -x^2 - 1 & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

an der Stelle 0. Ist  $f$  in diesem Punkt stetig bzw. differenzierbar?



# Lösung 6.9

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1.$$

Nicht stetig an der Stelle 0. (Daher auch nicht differenzierbar.)

## Aufgabe 6.10

Ist die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{für } x \leq 1 \\ \frac{x}{2} + \frac{3}{2} & \text{für } x > 1 \end{cases}$$

an der Stelle 1 stetig bzw. differenzierbar?

Berechnen Sie den (links- und rechtsseiten) Grenzwert an der Stelle  $x_0 = 1$ .

# Lösung 6.10

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2.$$

Stetig im Punkt 1, aber nicht differenzierbar.

# Aufgabe 6.11

Sind die folgenden Funktionen stetig auf dem Definitionsbereich?  
Skizzieren Sie die Funktionen.

(a)  $D = \mathbb{R}, f(x) = x$

(b)  $D = \mathbb{R}, f(x) = 3x + 1$

(c)  $D = \mathbb{R}, f(x) = e^{-x} - 1$

(d)  $D = \mathbb{R}, f(x) = |x|$

(e)  $D = \mathbb{R}^+, f(x) = \ln(x)$

(f)  $D = \mathbb{R}, f(x) = \lfloor x \rfloor$

(g)  $D = \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } x \leq 0, \\ x + 1 & \text{für } 0 < x \leq 2, \\ x^2 & \text{für } x > 2. \end{cases}$

Hinweis:  $\lfloor x \rfloor$  ist die größte ganze Zahl kleiner oder gleich  $x$ .

# Lösung 6.11

Die Funktion sind stetig in

(a)  $D$ ;

(b)  $D$ ;

(c)  $D$ ;

(d)  $D$ ;

(e)  $D$ ;

(f)  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ ;

(g)  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ .

## Aufgabe 6.12

Welchen Wert muss  $h$  besitzen, damit die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2hx & \text{für } x \leq 2, \\ 3x - h & \text{für } x > 2 \end{cases}$$

stetig ist?

# Lösung 6.12

$$h = \frac{2}{5}.$$